



COLLECTION
PELADE

L'ÉVALUATION DE LA MALADIE

Plusieurs **outils** tels que les **scores** et les **échelles d'évaluation** permettent de déterminer la sévérité de la maladie en fonction du pourcentage de chute des cheveux, des sourcils et des cils et de l'atteinte unguéale.^{1,2}

Lilly

SCORES ET ÉCHELLES



SCORE SALT

(Severity of Alopecia Tool)¹

- Intervalle de 0 à 100


% de cuir chevelu couvert par zone




Côté gauche
18 %



Côté droit
18 %



Sommet
40 %



Arrière
24 %

- Outil visuel pour l'estimation du pourcentage de **chute des cheveux** dans la pelade

Calcul du score SALT

- % de chute des cheveux sur chaque zone **multiplié par** le % du cuir chevelu couvert par cette zone
- **Somme** totale des 4 produits (chaque zone) = **score SALT**

SCORE SALT ABSOLU

- SALT 0 : aucune perte de cheveux
- SALT ≤ 20 % : perte de cheveux de 20 % ou moins
- SALT 50 : perte de cheveux de 50 %
- SALT 100 : perte de cheveux totale

SCORE SALT EN INDICE

- SALT₅₀ : 50 % de repousse par rapport à l'état initial
- SALT₉₀ : 90 % de repousse par rapport à l'état initial

LE SAVIEZ-VOUS ?

Lors de l'utilisation du score SALT, seules les zones de cheveux terminaux (dont l'épaisseur est arrivée à maturité) sont évaluées, les cheveux non terminaux (duvet) étant considérés comme des cheveux manquants.¹

ÉCHELLES DE CLINRO (Clinician-Reported Outcome)²

- En 4 points (de 0 à 3)
- Permet la mesure par le clinicien de la **chute des sourcils et des cils**²

MESURES CLINRO POUR LES SOURCILS



Échelle à 4 points :

- 0 = normaux
- 1 = lacunes minimales **et** distribution régulière des poils
- 2 = lacunes significatives **ou** distribution irrégulière des poils
- 3 = absence de poils visibles au niveau des sourcils

MESURES CLINRO POUR LES CILS



Échelle à 4 points :

- 0 = normaux
- 1 = lacunes minimales **et** cils espacés de manière régulière le long des deux paupières
- 2 = lacunes significatives **ou** cils espacés de manière non régulière le long des deux paupières
- 3 = absence de cils visibles

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des échelles de **PRO** (*Patient-Reported Outcome*) en 4 points (de 0 à 3) permettent aux **patients** d'auto-évaluer la **chute des sourcils, des cils, l'atteinte unguéale et l'irritation oculaires**.²

COLLECTION PELADE

Retrouvez l'ensemble des informations sur la maladie dans notre **collection PELADE** tels que les conséquences que cela peut avoir sur vos patients, les outils vous permettant de suivre et d'évaluer la prise en charge, en passant par les mécanismes à l'origine de cette maladie.

Références :

1. Olsen EA, Roberts J, Sperling L *et al.* Objective outcome measures: Collecting meaningful data on alopecia areata. *J Am Acad Dermatol.* 2018 Sep;79(3):470-478. **2.** Wyrwich KW, Kitchen H, Knight S *et al.* Development of Clinician-Reported Outcome (ClinRO) and Patient-Reported Outcome (PRO) Measures for Eyebrow, Eyelash and Nail Assessment in Alopecia Areata. *Am J Clin Dermatol.* 2020 Oct;21(5):725-732.

LILLY France S.A.S.

24 boulevard Vital Bouhot - 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex - Tél : 01 55 49 34 34

Société par Actions Simplifiée - 609 849 153 R.C.S. Nanterre

Information médicale et pharmacovigilance :

n° vert  0 800 003 636 ou : 01 55 49 32 51

