Rappel : Arsenal thérapeutique des Spondyloarthrites^(1,2)

Anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS)

Traitements de fond
synthétiques ciblés (tsDMARDs)

- Inhibiteurs des Janus kinases (JAK)
- Inhibiteurs des phosphodiésterases-4 (PDE4)*

* Uniquement pour le rhumatisme psoriasique
** Essentiellement pour les formes à prédominance périphérique

Traitements de fond
synthétiques conventionnels
(csDMARDs)**

- Méthotrexate (MTX)
- Sulfasalazine
- Léfipunomide

Antalgiques

Corticoïdes

Traitements de fond
biologiques ou Biomédicaments
(bDMARDs)

- Anti-TNF
- Anti-IL12/23*
- Anti-IL17
- Anti-IL 23p19*

Prise en charge des SpA axiales

➔ Traitements médicamenteux

Recommandations de prise en charge selon la HAS⁽³⁾

1^{re} intention

AINS
(± antalgiques, corticoïdes en infiltration)

Si réponse inadéquate

2^e intention

Traitement de fond biologique
▪ Anti-TNF

Si réponse inadéquate

3^e intention

Changement pour un autre traitement de fond :
▪ Anti-TNF
▪ Anti-IL17*
▪ Anti-JAK**

* En cas d'échec d'un anti-TNF et si un changement de cible thérapeutique est envisagé, les anti-IL17 doivent être privilégiés

** Uniquement pour les formes radiographiques

➔ Traitements non médicamenteux

- ➔ Rééducation⁽⁴⁾
- ➔ Arrêt du tabac⁽¹⁾
- ➔ Soins de pédicurie/appareillages⁽⁴⁾
- ➔ Mesures sociales, professionnelles et éducatives⁽⁵⁾
- ➔ Soutien psychologique⁽⁴⁾
- ➔ Chirurgie⁽¹⁾

Primo-délivrance d'un traitement de fond biologique

1 Identifier les besoins du patients

- Poser des questions ouvertes :

« Que savez-vous de ce traitement ? »

« Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce nouveau traitement de fond ? »

« Quelles difficultés rencontrez-vous au quotidien ? »

2 Rassurer avec les mots justes

- Entendre les appréhensions du patient
- Délivrer des messages clés rassurants :

« Ces traitements vont faciliter votre quotidien et freiner la progression de votre maladie. »

« Comme tous les médicaments, ils comportent des effets indésirables mais vous allez apprendre à les reconnaître et à les gérer. »

Suivi d'un traitement de fond biologique

1 Ouvrir le dialogue sur la douleur Douleur = Symptôme prédominant pour les patients⁽⁶⁾

- Aborder le sujet de la douleur

« Êtes-vous complètement soulagé par votre traitement ? »

- Encourager le patient

« Il ne faut pas vous résigner à souffrir »

- Rassurer le patient

« Il existe aujourd'hui de nombreux traitements qui peuvent vous soulager efficacement »

- Orienter vers le rhumatologue

« N'hésitez-pas à en parler à votre médecin qui pourra envisager un changement de traitement »

2 Evoquer les points de vigilance

- Informer sur les effets indésirables fréquents
- Rappeler qu'en cas de **signes d'alertes évocateurs d'une infection ou en cas de rougeur de l'œil**, il faut consulter en urgence son médecin⁽⁷⁾

3 Donner des conseils pratiques

En cas de :

- Désir de grossesse/allaitement
- Intervention chirurgicale/dentaire
- Vaccinations

4 Orienter le patient

- Associations de patients (AFS, AFLAR, AFP^{ric}...)
- Assistants sociaux, caisse d'allocations familiales ou MDPH^{*(7)}

* Maison départementale des personnes handicapées

(1) Wendling D *et al.* 2022 update of French Society for Rheumatology (SFR) recommendations about the everyday management of patients with spondyloarthritis. Joint Bone Spine, Volume 89, Issue 3, May 2022. (2) Gossec L *et al.* EULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2019 update. Ann Rheum Dis 2020;79:700-712. (3) Derniers avis de la commission de la transparence des dernières molécules commercialisées. (4) Ameli.fr Le traitement de la spondylarthrite ankylosante. Mis à jour le 19 octobre 2022. Consulté le 11 avril 2023. <https://www.ameli.fr/paris/assure/sante/themes/spondylarthrite-ankylosante/traitement-medical> (5) Haute Autorité de Santé. Guide ALD médecin : Spondylarthrite grave. Décembre 2008. (6) Kiltz U *et al.* Which aspects of health are most important for patients with spondyloarthritis? A Best Worst Scaling based on the ASAS Health Index. Rheumatology. 2016;55:1771-1776. (7) Haute Autorité de Santé. Guide ALD patient : La prise en charge de votre spondylarthrite. Décembre 2008.